

Resumen

Área total afectada por sequía




41.819.173 hectáreas.

Variación del área afectada respecto a Junio

↓ 15 M hectáreas aprox.

A nivel país, la superficie total en sequía disminuyó un cuarto respecto del mes anterior, principalmente por la reducción a casi la mitad de la categoría leve. Esto se explica por lo registrado en Patagonia, Cuyo y NOA. En contraposición, la categoría moderada aumentó considerablemente a nivel país, ya que se extendió en el noroeste de Patagonia y emergió notablemente en la zona precordillerana de Cuyo. NEA continuó con superficie total sin sequía, y el Centro evidenció el 5% de su superficie afectada en categoría leve.



Factores en riesgo

Stock Bovino



180.581 Cabezas

Cultivos



0 Hectáreas*

Población



0 Hogares**

* Aclaración: el cálculo de las has de cultivos afectados se realiza mediante el cruce entre el área en sequía moderada y severa y las categorías regular, mala y muy mala informadas por los delegados del SAGYP para estimaciones agrícolas.

** Este dato no contempla capitales de provincias ni distritales. Se calcula exclusivamente en casos de área afectada por categoría severa.

Indicadores

 **Precipitaciones**

Durante julio se registraron lluvias sobre gran parte del centro-este y norte del país, incluso en regiones donde las mismas suelen ser muy escasas. Por el contrario hacia el oeste del país (Cuyo y noroeste de Patagonia) persistió la falta de lluvias y/o nevadas. Las condiciones del ENOS se mantienen neutrales y el pronóstico prevé que continúe sin mayores cambios en los próximos meses.

 **Humedad de suelos**

Las condiciones deficitarias existentes a principios de julio en zonas del centro del país y en la meseta patagónica persistieron durante gran parte del mes, manifestando un alivio en los últimos días, mientras que en las regiones cordilleranas de Cuyo y el noroeste de la Patagonia se observó un agravamiento de la sequía. Algunos índices mostraron bajo contenido de humedad del suelo en forma localizada en partes de Córdoba, San Luis, La Pampa y el extremo sudoeste bonaerense.

 **Indices de vegetación**

Los valores del índice de vegetación fueron mayores al promedio en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, las anomalías fueron negativas al norte de la región Pampeana. El norte de Santa Fe y oeste de Santiago del Estero presentaron valores de NDVI menores al promedio de la serie histórica. Lo mismo se observa en otras zonas del centro y norte del país, que podrían estar asociadas a eventos de inundación.

 **Hidrología**

En la Cuenca del Plata, el río Paraná volvió a instalarse en aguas bajas luego de dos meses con una mejoría transitoria. El río Paraguay mostró una tendencia decreciente desde aguas medias hacia aguas medias bajas. El Uruguay inició el mes con algunos puertos en estado de alerta y evacuación y luego mostró descensos hacia aguas medias. Las presas nacionales monitoreadas por ORSEP presentaron niveles normales en todas las regiones evaluadas.

El monitoreo de sequías meteorológicas y agropecuarias de Argentina proporciona una visión integrada de las condiciones de sequía en el territorio nacional. El análisis es realizado por una mesa interinstitucional de especialistas y se basa en varias fuentes de datos, incluidas observaciones de expertos en campo, de acuerdo con el Protocolo interinstitucional de gestión de información ante la amenaza de sequías en el territorio argentino: https://www.magyp.gob.ar/sito/areas/d_eda/sequia/2022_protocolo_sequias.pdf

El mismo pretende identificar áreas con probable afectación por sequía, y su impacto concreto dependerá del sistema productivo, el manejo predial, la infraestructura disponible, entre otros condicionantes locales.