



Percepción de principales problemáticas en ganadería ovina extensiva al sur del río Santa Cruz

Seeber GA¹; Andrade MA¹; Gallardo RM¹ & Surraco C^{1, 2}

(1) INTA EEA Santa Cruz. Grupo de Producción Agropecuaria. (2) PIT Santa Cruz Oeste

seeber.german@inta.gob.ar



INTRODUCCIÓN

Resultados previos en Patagonia indican como principales problemáticas depredación (64,2%), disponibilidad de alimentación para la hacienda (53,1%) y falta de mano de obra (33,3%). El objetivo de este trabajo fue ampliar el estado de conocimiento sobre la percepción de los factores negativos de los establecimientos al sur del río Santa Cruz.

MATERIALES Y MÉTODOS

se realizó una encuesta dirigida a productores con establecimientos agropecuarios al sur del río Santa Cruz, mediada por *Google Form*. Las preguntas, cerradas, se orientaron a relevar la percepción de problemáticas que afectan al sector, manejo general del sistema, nutricional, reproductivo y sanitario. Por último, una reseña vinculada a la proyección de la actividad en el corto y mediano plazo.

Para evaluar la percepción de factores negativos sobre la producción se consideraron: depredadores; abigeato; disponibilidad forrajera del pastizal; escasez de lluvias; comercialización; herbivoría por guanacos y escasez de nieve. Cada uno de los factores con distinto nivel de percepción (muy alta, alta, media, baja y nula).

Por otro lado, se indagó respecto a pérdidas reproductivas, perinatales, muertes hasta la señalada y desde ese período a ventas y mortandad de adultos utilizando la misma escala de incidencia.

| FACTORES | Percepción de los productores | | | | | Pérdidas | Percepción de los productores | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | NULA | | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | NULA |
| Depredadores | 39,3% | 39,3% | 17,9% | 3,5% | 0,0% | Reproductivas | 0,0% | 0,0% | 3,6% | 67,8% | 28,6% |
| Abigeato | 7,1% | 17,9% | 39,3% | 28,6% | 7,1% | Perinatales | 0,0% | 17,9% | 46,4% | 32,1% | 3,6% |
| Disponibilidad del pastizal | 39,3% | 39,3% | 21,4% | 0,0% | 0,0% | Muertes hasta Señalada | 0,0% | 14,3% | 25,0% | 57,1% | 3,6% |
| Escasez de lluvias | 39,3% | 39,3% | 17,9% | 3,5% | 0,0% | Muertes Señalada - Venta | 0,0% | 14,3% | 25,0% | 57,1% | 3,6% |
| Comercialización | 14,4% | 7,1% | 21,4% | 32,1% | 25,0% | Mortandad Adultos | 0,0% | 17,9% | 50,0% | 32,1% | 0,0% |
| Herbivoría | 39,3% | 32,1% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | | | | | | |
| Escasez de nieve | 25,0% | 32,1% | 25,0% | 10,8% | 7,1% | | | | | | |

RESULTADOS

Se relevaron 28 establecimientos con un total de 348.338 cabezas que corresponden con un 16% del total de la Provincia, sobre una base estimada de SENASA La raza primaria entre los encuestados fue Corriedale (42,9%), seguida de Merino Multipropósito (35,7%).

Los factores depredadores, disponibilidad del pastizal, herbivoría por otras especies y escasez de lluvias fueron percibidos por más del 75% de los encuestados con un efecto alto o muy alto sobre la producción. En tanto en orden de importancia le siguió la escasez de nieve (57,1%) y en menor medida comercialización y abigeato.

En tanto las pérdidas vinculadas al sistema, las perinatales y mortandad en adultos fueron las más relevantes entre los encuestados. En menor medida las muertes hasta la señalada o entre señalada y venta.

CONCLUSIÓN

Según la percepción de los productores, los factores de mayor incidencia negativa en relación a la ganadería ovina al sur del río Santa Cruz son: depredadores, disponibilidad forrajera, escasez de lluvias y herbivoría producida por guanacos. En tanto, al explorar el ciclo son nulos los problemas reproductivos y con mayor presencia de impacto negativo se encuentran las pérdidas perinatales y mortandad en adultos.