

Estimaciones agrícolas

Informe semanal

27 de marzo de 2024

INFORME SEMANAL al 27 de marzo de 2024


Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 27/03/2024
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar




Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Como estaba previsto, las lluvias más importantes de la última semana se reportaron entre miércoles y jueves en la franja este del país. Los mayores acumulados se registraron en Ituzaingó (93mm), CABA (75mm), Corrientes (69mm), y Gualeguaychú (63mm), con gran cantidad de localidades de toda la región con milimetrajés de 30-60mm. Fuera del Litoral y alrededores se destacan los máximos puntuales de Bolívar (34mm), Trenque Lauquen (25mm), Hernando (20mm) y Bariloche (17mm). En el resto del país no se superaron los 10mm, según datos oficiales.




Precipitaciones acumuladas en la semana

Durante toda la semana se esperan lluvias en el NOA. Durante hoy miércoles se esperan eventos en Mendoza, San Juan, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y sur de Santa Fe. Entre miércoles y viernes se podrían dar precipitaciones de forma aislada en Patagonia. Durante el domingo podrían darse lluvias en San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires, Entre Ríos y el NEA. En esta última región las precipitaciones podrían extenderse hasta el martes.

TEMPERATURAS

Las temperaturas medias de la última semana fueron superiores a las normales en Cuyo, NOA y este del NEA, mientras que se dieron de acuerdo a lo esperado para la época del año en el resto del territorio argentino. En sectores de Mendoza las anomalías térmicas superaron los 5°C por encima de la media. Las máximas superaron los 35°C en la mayor parte de la zona central, Cuyo, NOA y NEA, destacándose Tinogasta (42°C) y Las Lomitas (41,8°C). Por otro lado, se registraron heladas agronómicas en gran parte de Patagonia, y heladas meteorológicas principalmente en regiones precordilleranas, reportándose en Maquinchao (-3°C) la mínima semanal absoluta.




Anomalía de la temperatura media de la semana

En la semana se esperan temperaturas normales a por sobre lo normal en norte y centro del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a por debajo de lo normal. Entre miércoles y sábado se espera que las temperaturas vayan en aumento paulatino en el centro y norte argentino con posibilidad de máximas sobre 35°C en el este de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca y La Rioja. Además durante el sábado podrían darse condiciones de máximas sobre 40°C en el este de Salta y oeste de Formosa. El ingreso de un sistema frontal, hará que las temperaturas desciendan entre domingo y martes en la zona centro y sur y entre domingo y lunes en el norte del país.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para lotes con SOJA DE PRIMERA. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php. Se observa un retroceso generalizado de los excesos hídricos de las últimas semanas en la mayor parte del área sojera nacional debido a la disminución de la intensidad de lluvias de los últimos días. Aun así, en el centro-norte de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se conservan sectores con reservas excesivas y excesos hídricos. En el resto de dichos sectores las reservas son, en general, óptimas. En Córdoba, sudoeste de Santa Fe y oeste de Buenos Aires desaparecen los excesos hídricos y predominan los niveles de humedad adecuados y óptimos. Condiciones similares presenta el sudeste bonaerense, mientras que en el centro-norte de La Pampa se mantienen los almacenajes regulares y adecuados. Por otro lado, en el sudoeste de Buenos Aires y sudeste de La Pampa prevalecen las condiciones deficitarias. En el NOA también se observa un retroceso de los excesos hídricos y predominan las reservas de regulares a óptimas, en tanto que en el norte de Chaco y mayor parte de Formosa, mantienen niveles de humedad insuficientes.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN
y del INTA e información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

En la provincia de Chaco continúa la cosecha de los primeros lotes en la zona de la delegación Charata obteniéndose rindes que promedian los 18 qq/ha con un 9% de avance. El resto del cultivo se desarrolla entre etapas vegetativas a pleno capsulado presentando buen estado en general.

En la provincia de Santa Fe comenzó la cosecha al norte del departamento Nueve de Julio. Los rendimientos son buenos, pese a las variables climáticas ocurridas, en el orden de los 18-20 qq/ha. Los lotes más avanzados, aún en pie, se encuentran en la etapa de apertura de cápsulas, mientras que los muy tardíos, un 10-20% de la superficie, están aún en floración y les falta el llenado de cápsulas, pudiendo ser afectados por heladas tempranas. Se observa alta presencia de malezas en algunos cuadros al este de la delegación Avellaneda lo que afectará la calidad y el rinde potencial. En los lotes tardíos hay presencia de picudo del algodón ocasionando pérdida de cargas.

En la provincia de Salta un importante porcentaje de los lotes con algodón se encuentra en pleno capsulado. Los más adelantados ya están próximos a su apertura. Los más atrasados transitan aún la floración, siendo beneficiados por las recientes lluvias. La condición del cultivo, por lo general, es buena.

Se inició la cosecha de los primeros lotes bajo riego localizados en la región oeste de Santiago del Estero alcanzándose rindes de 25 qq/ha promedio. En general, se observa mucha variación en el estado del cultivo, con lotes muy buenos y otros más afectados por las altas temperaturas. La mayoría de los realizados en secano están en llenado de cápsula, terminando la floración.

ARROZ

Prosigue la cosecha en toda la zona productiva de este cereal.

En la provincia de Corrientes, alcanzó el 81% de avance del largo fino y un 77% del largo ancho. Los rindes obtenidos promedian los 70 qq/ha y 50 qq/ha, respectivamente.

En la provincia de Entre Ríos, se registra un avance del 46% de la superficie recolectada del arroz largo fino en la delegación Paraná y del 25% en la delegación Rosario del Tala. Los rendimientos son muy buenos promediado los 75-80 qq/ha. En esta última delegación continuó la cosecha de la variedad largo ancho con un 11% de avance y un rinde promedio que se mantiene en los 60 qq/ha.

En la provincia de Santa Fe prosigue la trilla del arroz largo fino en el departamento San Javier, con rendimientos que promedian los 62 qq/ha con un 65% de avance. Los lotes de la variedad largo ancho se encuentran, en su mayoría, en llenado de granos, con algunos comenzando la maduración. Aumenta el ritmo de cosecha en el departamento Garay, alcanzando el 65%, con buenos rindes, entre 68 y 77 qq/ha para la variedad largo fino. Asimismo

comenzó la recolección de la variedad largo ancho con un rendimiento promedio de 62 qq/ha, con un 20% de avance.

GIRASOL

BUENOS AIRES



La mejora en las condiciones climáticas permitió proseguir con las tareas de recolección en toda la provincia en los lugares con piso y buenos caminos, alcanzando un avance del 69% y un rinde promedio de unos 22 qq/ha. El resto de los lotes que quedan en pie se encuentran transitando diferentes grados de madurez. En la semana finalizó la cosecha en las delegaciones Pergamino y Bragado con rindes que promediaron los 29 y 25 qq/ha, respectivamente.

CÓRDOBA



Se completó la trilla del 82% de la superficie estimada, con rendimientos entre 22 y 27 qq/ha.

LA PAMPA



Durante la semana se registró un avance de cosecha que alcanzó el 84%, obteniéndose rendimientos que promediaron los 23,7 qq/ha. En la región norte (delegación General Pico) el análisis comercial de la mercadería indica lotes con porcentajes elevados del rubro materias extrañas. El porcentaje promedio del rubro materia grasa es inferior al obtenido durante la campaña anterior.

SANTA FE



Con la cosecha de los últimos lotes localizados en las delegaciones Casilda y Cañada de Gómez se da por concluida la misma en toda la provincia. Los rindes alcanzaron promedios de 13 qq/ha en los departamentos del norte hasta 27 qq/ha en el sur, delegación Venado Tuerto.



Prosigue la cosecha a medida que se alcanza la humedad comercial, con rendimientos acordes a la zona y a las precipitaciones que ocurrieron durante su ciclo. Bajo riego varían entre los 24 y 30 qq/ha, mientras que en secano oscilan de 16 a 22 qq/ha.

MAÍZ



Prosiguió la cosecha de maíces tempranos en el norte provincial (delegaciones Pergamino, Junín y Lincoln) a pesar de que todavía tienen algo de humedad en el grano. Los vientos fuertes de la semana pasada han provocado el vuelco de plantas. Los rendimientos rondan los 78 y 100 qq/ha. Las tardíos se han comportado mejor con respecto a los vientos porque la planta todavía se encuentra verde. En general, se estima que van a rendir mejor que los tempranos.

Se han levantado algunos lotes de siembras tempranas en J.J. Paso (delegación Pehuajó) afectados severamente por la sequía y altas temperaturas del verano con rendimientos muy bajos, del orden de los 25-30 qq/ha; se espera que sea el piso de rendimiento del cultivo, pero puede haber sorpresas negativas en muchas siembras tempranas sin almacenaje de agua suficiente a la siembra.

Prosigue la cosecha de los maíces de siembra temprana en las delegaciones Bragado y Veinticinco de Mayo, aunque fue interrumpida por las precipitaciones de la semana. Los primeros rindes alcanzan un promedio de 75-80 qq/ha. Los maíces de siembra tardía y de segunda se encuentran en estado de pleno llenado de grano. Dependiendo la fecha de siembra de los maíces tardíos, la producción será variable según si el período crítico de floración coincidió o no con la ola de calor de la segunda quincena de enero y primera semana de febrero.

Los excesos hídricos impidieron proseguir con la cosecha en el ámbito de la delegación Bolívar. En tanto que en la zona de Salliqueló continuaron las labores de recolección del maíz temprano con rindes muy dispares y en general bajos por haber sido afectado seriamente por las temperaturas de enero.

Se comenzaron a cosechar los primeros lotes en el norte de la delegación General Madariaga. El resto de los lotes se encuentran entre grano pastoso y madurez.

En la zona de la delegación Tandil, las lluvias registradas la semana pasada mantienen condiciones entre óptimas y algunos excesos dependiendo de la ubicación de los lotes. El maíz temprano inició la etapa de madurez, con buen estado general, y avanza el picado del maíz con destino forraje.

En la delegación Tres Arroyos las lluvias que se produjeron fueron muy escasas y dispersas por lo que el cultivo está sufriendo la falta de agua principalmente en el partido de Coronel Dorrego y el oeste de Coronel Pringles en donde la situación hídrica es crítica, con lotes de maíz que fueron destinados para pastoreo.

En la delegación Bahía Blanca no se han dado precipitaciones continuando con una humedad del perfil muy escasa. Los maíces se encuentran en su gran mayoría en madurez perdiendo humedad de sus granos. La condición va de regular a mala en el área de secano, y buena en la de riego.



En la zona de la delegación Laboulaye el maíz temprano se encuentra en R6 (madurez fisiológica) y a la espera de la humedad adecuada para iniciar la cosecha. La mayoría de los lotes de maíz tardío y de segunda está entre grano lechoso y pastoso. Se están picando aquellos lotes con destino a ensilado.

Prosigue la cosecha del maíz temprano en la delegación Marcos Juárez con un mayor avance en la zona centro-norte donde un 20-25% se encuentra recolectado y los rindes promedian los 100 qq/ha. En la zona centro-sur la recolección es muy incipiente pero los primeros rindes se ubican por encima de la media. Aproximadamente el 60% de la superficie se encuentra en madurez, variando la humedad de 15% a 20-22% estando la mayoría en 17%. Los maíces tardíos y de segunda, en general, están en buenas condiciones. Se observan síntomas por Spiroplasma, y aunque en general, no son severos, algunos lotes fueron muy atacados, esperándose mermas en el rinde pero en un porcentaje menor al 10%.

En la delegación Río Cuarto, los maíces tempranos ya están maduros, estimándose que, de continuar el buen tiempo, pronto comenzaría la cosecha. Los tardíos fueron beneficiados por las lluvias permitiendo un adecuado llenado de granos.

Los lotes implantados en la zona de la delegación San Francisco, en su mayoría, se encuentran en grano pastoso. Comenzó la recolección de los primeros lotes de siembras tempranas. Los síntomas por ataque de la chicharrita del maíz son muy variables, estimándose que podría haber merma en los rendimientos. En la semana se dieron ráfagas de viento por encima de lo normal generando vuelco de cultivos.

Durante la última semana hubo fuertes tormentas en el ámbito de la delegación Villa María, pero con pocos milímetros registrados. También se registraron fuertes vientos y caída de granizo en algunas zonas rurales. El cultivo de maíz se encuentra en plena etapa de llenado de granos, entre grano lechoso y pastoso. Los lotes sembrados temprano están en etapa de maduración siendo inminente su cosecha. Con respecto a la chicharrita, está presente en gran parte de los lotes. Se observan plantas aisladas con Spiroplasma, pero en el ámbito de la delegación pocos lotes afectados por completo.



El cultivo se desarrolla entre etapas vegetativas a llenado los más avanzados, en condiciones dispares. Se observa gran cantidad de cuadros afectados por Spiroplasma, algunos de los cuales presentan pérdidas del 100%.



A medida que disminuye la humedad de los granos avanza la recolección de los últimos lotes de maíz de primera en la delegación Paraná. Los rendimientos obtenidos son buenos a muy buenos con un valor promedio de 74 qq/ha. Los maíces de segunda avanzan hacia el llenado de los granos, en buenas condiciones aunque se observa la presencia de chicharrita en muchos lotes con distintos niveles de afectación de Spiroplasma en plantas aisladas.

Se retomaron las actividades de trilla en la delegación Rosario del Tala, aprovechando el buen tiempo de los últimos días. Los rindes del maíz temprano son muy buenos, promediando los 80-90 qq/ha. En cuanto al maíz de segunda o tardío, preocupa la infestación con chicharrita (*Dalbulus maidis*) observándose los síntomas característicos de Spiroplasma en las plantas, estimándose menores rindes.



La ausencia de lluvias en la zona norte de la provincia (delegación General Pico) permitió el inicio de los trabajos de cosecha en lotes de maíces tempranos, los que se desarrollan en forma lenta y su avance porcentual no supera el 5% de la superficie sembrada total del cultivo destinado a grano. Los rendimientos oscilan entre 70 y 90 qq/ha. Con respecto al resto de la superficie, la misma transcurre las etapas de llenado de grano y los lotes más adelantados poseen espigas en las que sus granos ya superaron su madurez fisiológica. El estado general de estos lotes es calificado como bueno con expectativas de buenos rendimientos particularmente en el sector este de la región.

En el área sur (delegación Santa Rosa) se registraron precipitaciones con un promedio de 13,2 mm. La reserva hídrica del suelo está en condición adecuada/regular. Los maíces de primera siembra temprana, que están en etapa R6 con una humedad entre 19% y 20%, se encuentran en buenas condiciones con síntomas de estrés hídrico producto de la ola de calor transitada durante enero la cual afectó el potencial de rendimiento. Los maíces de primera tardíos, que se encuentran entre las etapas R3-R4, también se vieron afectados por la intensa y continua ola de calor de enero. El grado de afectación depende mucho del cultivo antecesor, viéndose más perjudicados los que vienen de un campo natural y pasturas que aquellos lotes cuyo manejo es mayormente agrícola.

Se siguen observando muchos lotes con malezas de difícil control, Eleusine y Chloris. Los maíces de segunda, en estado R2-R3, también sufrieron el déficit hídrico, pero las lluvias de la segunda quincena de febrero y lo que va de marzo, llegaron a tiempo para su recuperación aunque su potencial de rendimiento ya fue disminuido.



Durante la semana se registraron precipitaciones en diferentes sectores de la provincia, de entre 5 y 30 mm, que ayudan a mantener la humedad edáfica y favorecen el estado de los cultivos. Se están picando lotes para reservas forrajeras. En algunas localidades son necesarias lluvias ya que las mismas no fueron generalizadas en toda la provincia.



En la delegación Avellaneda sólo quedan en pie el maíz tardío y el de segunda, los cuales se encuentran, principalmente, en etapa de llenado de granos, en buen estado, con notable recuperación después de las lluvias. Sin embargo, una parte está muy afectada por Spiroplasma, con pérdida total o destino forrajero, estimándose en un 20% del área. Un 40% tiene una afectación importante, se evaluará en los estados reproductivos y a cosecha, el porcentaje de pérdida. Un 40% se lo ve en un mejor estado, pero la cantidad de granos por espiga no es la óptima, provocando disminución del rendimiento. Hay ataques de pulgones que se van controlando junto a la chicharrita, pero no están funcionando muy bien para esta última plaga.

En la zona de la delegación Rafaela se reactivaron a buen ritmo las tareas de cosecha producto de la pérdida de humedad de grano, llegando a un 50% de la superficie del maíz temprano con muy buenos rindes, entre 65 qq/ha en zonas con limitantes edáficas y 120 qq/ha. en aquellos lotes de gran aptitud agrícola. Los maíces tardíos y de segunda se encuentran en llenado de granos, con una condición regular a buena y muy buena, según el grado de afectación con Spiroplasma. En aquellos lotes donde fue más intensa comenzaron las tareas de picado para consumo animal.

Con lentitud está recomenzando la cosecha en la delegación Casilda, ya que buena parte de los suelos aún presenta condiciones de intransitabilidad. Los lotes cosechados siguen con buenos rendimientos, con un promedio actual entre 90 a 110 qq/ha. Debido a la gran humedad reinante se ha observado en algunos casos el brotado en espiga lo cual desmerece la calidad comercial. Los maíces tardíos finalizan el llenado de grano con adecuada humedad edáfica y temperaturas acordes al ciclo.

En la delegación Venado Tuerto continúa la cosecha con rendimientos buenos a muy buenos en varias zonas, promediando los 98 qq/ha con un 35% recolectado.



El cultivo presenta un aspecto muy disímil según las lluvias recibidas a lo largo de su ciclo, las altas temperaturas y la etapa fenológica. Además, a medida que avanza en su desarrollo aparecieron de manera muy acelerada los daños causados por Spiroplasma. Cabe recordar que en la provincia se siembra más tarde que en otras regiones, y este año con la falta de lluvias se sembró, incluso más tarde. En la zona de Quimilí el perjuicio es mayor y todavía no se puede evaluar correctamente, ya que hay varios lotes en estado vegetativo o floración que todavía pueden presentar síntomas, el resto está en inicio de llenado de granos. Hay aproximadamente un 20% de lotes con afectaciones graves y otro porcentaje con daños un poco menores.



En la provincia de Jujuy la semana se presentó con pocas precipitaciones y disminución de temperatura, lo que evitó la evaporación excesiva de la humedad del suelo. Las reservas hídricas continúan siendo adecuadas hasta el momento. El cultivo avanza en la fase de llenado de granos, con buenas perspectivas en general y poca presencia de lotes afectados por Spiroplasma, lo que permite proyectar rendimientos adecuados.

En las provincias de Salta y Tucumán el cultivo volvió a recibir aportes pluviales en momentos definitorios de rendimiento. A pesar de lo mencionado, la presión de la chicharrita, vector de Spiroplasma, continúa siendo muy alta y se esperan pérdidas importantes en el rendimiento de algunos planteos. Los lotes más adelantados se encuentran en grano pastoso.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires el cultivo se encuentra entre las etapas de floración y llenado en buen a muy buen estado. Se han iniciado las labores de inversión de las plantas en el partido de Bragado. Se estima que la cosecha se efectuará en 30 días aproximadamente, una vez que se hayan secado las chauchas como el grano de la oleaginosa.

En la provincia de Córdoba, la mayoría de los lotes se encuentra en etapas que van desde llenado de granos hasta inicios de madurez, los más adelantados. En general, las expectativas para el cultivo son buenas, y se estiman rendimientos por encima del promedio.

Comenzaron a arrancarse los primeros lotes de maní en la provincia de San Luis.

En la región del NOA una parte importante de los planteos con maní ya se encuentra llenando cajas. Algunos pocos aún permanecen en etapa de floración, pudiendo aprovechar las recientes lluvias de manera más ventajosa para un buen rendimiento.

POROTO

En la provincia de Jujuy los distintos porotos se encuentran, en su mayoría, en etapa vegetativa de crecimiento e iniciando una incipiente floración. Los lotes presentan buenas condiciones gracias al aporte de humedad permanente desde la siembra.

En la provincia de Salta, la adecuada humedad disponible en los primeros centímetros del suelo permitió la culminación de la siembra del poroto alubia en la zona norte. Los planteos ya emergidos con distintos tipos de porotos presentan una adecuada condición, en etapas que van del crecimiento vegetativo al comienzo de llenado de granos.

SOJA



Las sojas de primera ya se están entregando en la región centro-norte y durante la semana se van a comenzar a cosechar los primeros lotes. Los mismos presentan muy buen aspecto y una buena cantidad de chauchas las que han granado y llenado muy bien. En la zona oeste, más afectada por la ausencia de lluvias adecuadas se esperan rendimientos moderados. En el sur provincial se encuentran finalizando el llenado e iniciando la madurez con buen estado general.

Las de segunda se han recuperado mucho de la pequeña seca que sufrieron en los primeros estadios, han granado y están llenando grano muy bien. No se observa presencia importante de insectos.



En general, el cultivo de soja temprana o de primera ocupación ya se encuentra iniciando la etapa de madurez a plena madurez. Se esperan buenos a muy buenos rindes. Se han comenzado a trillar algunos lotes en la delegación Marcos Juárez con rindes variados pero en general, por arriba de la media. También se inició en la delegación San Francisco con rendimientos entre los 28 y 42 qq/ha.

Las sojas tardías o de segunda están en pleno llenado de granos con aceptable estado y buenos rendimientos potenciales, mejorando mucho con las lluvias registradas desde mediados de febrero y en marzo.



En el ámbito de la delegación Charata, los cuadros de soja avanzan en etapa reproductiva en condiciones regulares a buenas. El descenso marcado de la temperatura registrado durante la presente semana favorece el desarrollo de estructuras reproductivas y llenado, sobre todo para cuadros que venían complicados con estrés térmico e hídrico.

En la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo se desarrolla en etapas de crecimiento a formación de vainas en algunos lotes más adelantados, observándose una recuperación aceptable de los mismos, pero hay sectores e incluso parcelas enteras que presentan daños irreversibles con una disminución importante en su rendimiento potencial.



En la zona de la delegación Paraná, las sojas de primera como de segunda se encuentran atravesando etapas de llenado. La condición general de las mismas es buena, con buenas perspectivas de rendimiento. La cosecha se iniciaría durante los próximos días.

En la delegación Rosario del Tala los lotes de soja de primera presentan una muy buena evolución, en etapa de llenado de granos, y los más avanzados iniciando la maduración. A pesar de la infestación de chinches, la apariencia del cultivo es muy buena en general. Los de soja de segunda también presentan un muy buen aspecto, con algo de roya, pero controlada. Se incrementaron las labores de control de hormigas. También en etapa de llenado de grano la mayoría de los lotes.



En el área de la delegación General Pico si bien las lluvias significativas de la semana anterior beneficiaron a los lotes de soja de primera que transcurren la etapa fisiológica de formación y llenado de semillas, a campo se observa una cantidad significativa de lotes con su follaje ya amarillo. El estado general del cultivo es calificado como bueno. Los lotes de segunda transcurren la etapa fisiológica R3/R4, en buen a muy buen estado en su mayor parte, con excelente follaje, altura de plantas y expectativas de muy buenos rendimientos.

En el área de la delegación Santa Rosa la reserva hídrica del suelo está en condición adecuada/regular. El estado fenológico de las sojas de primera es R7 (inicio de madurez) y se encuentran en buenas a regulares condiciones, recuperándose de la ola de calor de enero gracias a las lluvias de febrero y las que se registraron en marzo. Las sojas de segunda, que fueron las más afectadas por el estrés hídrico y calórico de enero, se encuentran en etapa R5 (inicio formación

semillas). Comenzaron a proliferar las plagas como chinche, isoca y arañuela roja común que se están controlando.



En la delegación Avellaneda se observa una notable recuperación de algunas plantaciones tempranas y tardías debido a las lluvias caídas y a las temperaturas adecuadas para el llenado, aunque no es general. En algunas zonas las sojas tempranas quedaron ralas y afectadas tanto por exceso de humedad y por estrés de temperaturas. Las tardías tuvieron menor desarrollo de planta, pero están llenando granos en condiciones óptimas.

En la delegación Rafaela la soja de primera transita las etapas de fin de llenado de granos y madurez. La gran mayoría de los lotes se encuentra en condiciones muy buenas a excelentes. Se cosecharon algunos lotes puntuales con rindes de 50 a 58 qq/ha, en la zona sur del departamento Castellanos, muy por encima de lo esperado. Se espera que en los próximos días comiencen a generalizarse las tareas de cosecha. La soja de segunda presenta óptimas condiciones de desarrollo para transitar las etapas que van de formación de vainas a llenado de granos. Si bien se observan cuadros con mayor presencia de malezas, se esperan rindes muy cercanos a los cuadros de primera. Se realizan aplicaciones contra chinche y enfermedades de fin de ciclo.

En la delegación Casilda se han realizado pruebas de recolección en casos puntuales. El rendimiento obtenido en tales avances sobre variedades precoces ha sido satisfactorio, con marcas de hasta 40 qq/ha. El grueso de la recolección tendría fecha de inicio dentro de diez días. Se ha detectado alguna podredumbre en vainas en el tercio inferior de las plantas, producida por un complejo de hongos, con preponderancia de aparición en suelos saturados. Está finalizando la etapa de llenado de granos de las sojas de segunda con humedad edáfica adecuada a excesiva, lo cual determina que se observen algunos rodales amarillentos producto de anegamientos temporarios. El estrés térmico e hídrico de enero ha afectado al cultivo en menor proporción que la soja temprana, por lo que las últimas lluvias permitieron que la de segunda recupere su potencial productivo.

En Venado Tuerto continúa la cosecha de la soja de primera a ritmo lento, esperándose un aumento en la velocidad de las tareas en los próximos días de acompañar el clima. Las sojas de segunda están en estado R5 llegando a R6. Se estiman rendimientos aceptables.



Los lotes de soja en la zona de la delegación Santiago del Estero se encuentran muy bien, en general, estimándose rindes promedio de 35 qq/ha, con algunos que pueden superar los 40 qq/ha.

En el área de la delegación Quimilí hay lotes muy buenos que seguramente van a tener excelentes rindes y otros muy sufridos, arrebatados por el calor que empiezan a madurar pero la mayoría de los lotes están en inicio de llenado de granos.



El cultivo está transitando, en su totalidad, la fase reproductiva, observándose vainas con un incipiente llenado de granos. La mayoría de los planteos presenta condiciones buenas a muy buenas.

SORGO



El cultivo presenta buenas condiciones, en general, entre las fases de llenado de granos, al sur y llenado de granos a madurez, al norte de la provincia. Se los observa sanos y en buen estado general.



Los lotes con sorgo presentan un buen estado general. Se encuentran completando el llenado de granos y los más avanzados en madurez. Los destinados a forraje se están picando o pastoreando.



Continuaron los trabajos de cosecha avanzando hasta casi el 30% de la superficie implantada. Los rendimientos obtenidos hasta el momento son buenos a muy buenos, de unos 40 a 55 qq/ha promedio. Un 70% de los lotes en pie ya está madurando.



Prosigue la cosecha en la delegación Avellaneda con rendimientos medios a bajos. Se observan muy desparejos por la etapa de estrés hídrico sufrida en enero y comienzos de febrero y las lluvias irregulares.

También continúa la cosecha en la delegación Rafaela con muy buenos rindes, entre 55 y 65 qq/ha. Se realizaron además las tareas de picado de los lotes destinados a consumo animal. Los cultivos presentan condiciones buenas a excelentes. Se desarrollan en la etapa final de llenado de granos y madurez.

En la delegación Casilda gran parte de la superficie implantada ya se encuentra en condiciones de aptitud para su recolección, pero no se avanza a este respecto dada la preponderancia que tiene la cosecha de maíz y a que los suelos aun manifiestan anegamientos o falta de firmeza para el tránsito de maquinaria. Se detectó una proporción no menor de granos brotados en las panojas.




El cultivo se encuentra, en su mayoría, en floración o iniciando el llenado de granos. Se esperan resultados mejores que el maíz ya que no presenta daños por problemas sanitarios. Algunos lotes están un poco más afectados por las temperaturas en las zonas con menores lluvias.



El cultivo atraviesa etapas que van del crecimiento vegetativo hasta el llenado de granos. Por lo general el estado del cultivo es bueno a muy bueno.

MAPA DE DELEGACIONES





AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	22/02 %	29/02 %	07/03 %	14/03 %	21/03 %	27/03 %
CORRIENTES	LA	11.600			8	26	58	77
	LF	83.400		2	14	38	65	81
T. CORRIENTES		95.000		2	13	37	64	81
R. S. Peña	LA	0						
	LF	5.900						
T. CHACO		5.900						
PARANA	LA	2.200						
	LF	24.520			9	28	40	46
T. PARANÁ		26.720			8	26	37	42
R. DEL TALA	LA	3.900					4	11
	LF	31.400		5	6	7	16	25
T. R.DEL TALA		35.300		4	5	6	15	23
T. ENTRE RÍOS		62.020		3	7	15	24	32
FORMOSA	LA	0						
	LF	15.000						
T. FORMOSA		15.000						
AVELLANEDA	LA	1.200						
	LF	10.300	10	15	25	50	55	65
T. AVELLANEDA		11.500	9	13	22	45	49	58
RAFAELA	LA	300						20
	LF	14.000					35	65
T. RAFAELA		14.300					34	64
T. SANTA FE		25.800	4	6	10	20	41	61
TOTAL PAÍS	LA	19.200	0	0	4	14	31	43
	LF	184.520	1	3	10	25	42	54
TOTAL PAÍS 23/24		203.720	1	2	10	24	41	53
TOTAL PAÍS 22/23		193.780	1	5	12	24	39	58

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	22/02	29/02	07/03	14/03	21/03	27/03
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	3.900			6	33	65	86
Bolívar	84.800			14	34	59	85
Bragado	8.600			30	40	40	100
General Madariaga	71.300			1	12	80	84
Junín	3.930				73	73	80
La Plata	9.000			15	45	80	90
Lincoln	35.000			2	25	45	83
Pehuajó	93.000		13	70	100	100	100
Pergamino	2.780			23	78	78	100
Pigüé	90.000	1	3	3	20	50	70
Salliqueló	155.000				4	22	57
Tandil	230.000				18	37	66
Tres Arroyos	257.811				16	34	57
25 de Mayo	50.767			1	7	14	55
BUENOS AIRES 23/24	1.095.888	0	1	8	24	45	69
22/23	1.266.672	0	0	1	5	19	39
Laboulaye	67.923				26	26	80
Marcos Juárez	36.400		2	34	68	71	91
Río Cuarto	12.500				34	70	90
San Francisco	30.070	31	64	65	74	75	75
Villa María	9.000					22	69
CÓRDOBA 23/24	155.893	6	12	21	45	50	82
22/23	152.179	9	12	13	27	49	88
Paraná	11.225	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	6.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 23/24	17.225	100	100	100	100	100	100
22/23	20.090	83	86	87	91	94	95
General Pico	189.500	6	9	30	50	62	87
Santa Rosa	112.000		5	30	50	70	80
LA PAMPA 23/24	301.500	4	7	30	50	65	84
22/23	281.900	0	0	4	9	17	37
Avellaneda	145.100	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	10.000	56	57	57	80	90	100
Casilda	8.000				46	46	100
Rafaela	35.200	98	99	100	100	100	100
Venado Tuerto	800		50	85	100	100	100
SANTA FE 23/24	199.100	93	93	94	97	97	100
22/23	388.015	91	97	99	100	100	100
CATAMARCA	50						
CORRIENTES	700	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	81.100	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	63.320	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	3.100	100	100	100	100	100	100
JUJUY	0						
MISSIONES	0						
SALTA	960						
SAN LUIS	80.200			1	27	34	54
STGO. ESTERO	2.350						
STGO. ESTERO (Quimilí)	9.510	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	110						
TOTAL PAÍS 23/24	2.011.006	19	21	28	43	58	77
22/23	2.465.201	24	25	27	30	41	57

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	22/02 %	29/02 %	07/03 %	14/03 %	21/03 %	27/03 %
Bahía Blanca	15.500						
Bolívar	246.000			3	4	4	4
Bragado	177.000				1	1	10
General Madariaga	141.000						1
Junín	208.000				10	10	20
La Plata	42.500			1	4	5	6
Lincoln	331.000					1	3
Pehuajó	385.500						
Pergamino	176.450				1	1	5
Pigüé	150.000						
Salliqueló	250.000				5	16	41
Tandil	340.000						
Tres Arroyos	365.467						
25 de Mayo	178.952				1	1	3
BUENOS AIRES 23/24	3.007.369			0,3	2	2	5
22/23	2.928.935			1	1	3	6
Laboulaye	503.684						
Marcos Juárez	426.500				9	11	17
Río Cuarto	634.000						
San Francisco	753.000					1	2
Villa María	610.000						
CÓRDOBA 23/24	2.927.184		0	0	1	2	3
22/23	3.064.224		0,1	0,2	2	3	6
Paraná	157.600		11	32	50	57	62
Rosario del Tala	418.000		10	16	16	17	22
ENTRE RÍOS 23/24	575.600	0	10	21	26	29	34
22/23	489.280	33	48	60	69	72	72
General Pico	453.900						5
Santa Rosa	211.200						
LA PAMPA 23/24	665.100					0	3
22/23	680.400					3	10
Avellaneda	175.000	7	7	8	8	8	8
Cañada de Gómez	279.821				5	20	30
Casilda	201.000						15
Rafaela	337.500			7	13	18	28
Venado Tuerto	215.000			3	10	15	35
SANTA FE 23/24	1.208.321	1	1	3	7	13	24
22/23	1.261.512	0,2	1	11	14	23	28
CATAMARCA	18.100						
CORRIENTES	11.000	81	81	81	92	100	100
CHACO (Charata)	123.500						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200						
FORMOSA	46.100						
JUJUY	12.688						
MISSIONES	36.500		6	6	15	24	30
SALTA	378.550						
SAN LUIS	405.200						
STGO. ESTERO	198.500						
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200						
TUCUMÁN	89.220						
TOTAL PAÍS 23/24	10.497.332	0,2	1	2	3	4	7
22/23	10.533.195	2	2	4	6	8	10

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAÍZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/03/2024 al 27/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	-	-	2	98	14	68	18	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	2	73	25	-	A
	JUNÍN	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	3	97	54	46	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	2	98	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	15	85	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	2	98	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	5	95	-	70	25	5	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	44	55	1	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	10	90	20	70	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	17	80	3	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	10	90	-	80	20	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	6	50	30	14	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	100	-	-	98	2	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	5	95	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	6	42	52	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/03/2024 al 27/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	10	90	-	91	9	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	-	-	85	15	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	61	39	9	67	24	-	A
	JUNÍN	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	80	20	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	19	81	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	95	5	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	5	75	20	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	15	85	-	73	27	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	66	34	-	96	4	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	1	75	24	-	63	21	16	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	-	-	50	50	-	90	10	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	3	65	32	25	66	6	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	40	60	25	70	4	1	A
	RÍO CUARTO	-	-	10	69	21	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	18	73	9	-	72	28	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	20	61	19	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	20	3	77	3	97	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	30	70	35	48	10	7	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	20	50	30	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	20	80	-	-	68	32	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	4	8	79	9	5	34	28	33	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	30	70	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	-	35	65	56	44	-	-	E/A
	RAFAELA	-	-	4	46	50	53	41	6	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	5	95	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	91	9	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	15	48	37	-	8	49	35	8	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	90	10	-	-	-	58	42	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	60	40	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	12	88	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	5	33	62	-	-	88	11	1	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	3	97	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	2	3	94	1	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	10	60	30	-	-	40	20	40	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	70	30	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

Desde el 22/03/2024 al 27/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	67	33	-	13	77	10	-	-	11	78	11	-	15	73	12	-	A
	BRAGADO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	80	20	10	71	19	-	-	-	5	95	-	-	74	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	40	60	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	95	5	30	70	-	-	-	-	6	94	-	10	60	30	-	A
	LINCOLN	-	-	-	76	24	-	89	11	-	-	-	8	92	-	-	86	14	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	5	47	48	-	-	-	20	80	-	-	44	43	13	A
	PERGAMINO	-	-	-	2	98	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	99	1	-	50	50	-	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	100	-	-	86	14	-	-	-	13	87	-	-	85	15	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	50	50	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	77	23	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	90	10	-	69	28	3	-	-	1	99	-	-	77	17	6	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	-	-	98	2	-	82	18	-	-	-	-	100	-	-	96	4	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	83	17	22	65	9	4	-	-	11	89	-	25	70	5	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	35	65	13	83	4	-	-	-	-	100	-	-	88	10	2	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	79	21	-	73	17	10	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	1	86	13	-	69	29	2	-	-	23	77	-	-	64	36	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	68	32	-	100	-	-	-	-	14	72	14	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	4	96	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	90	10	30	70	-	-	-	-	20	80	-	20	65	15	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	20	71	9	10	60	30	-	-	-	100	-	-	-	28	50	22	A
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	86	14	-	-	-	-	100	-	-	-	56	44	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	98	2	11	48	28	13	-	-	28	72	-	2	35	36	27	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	35	65	54	26	20	-	-	-	-	100	-	44	30	26	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	44	46	10	-	-	-	-	100	-	20	54	26	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	92	8	51	43	6	-	-	-	-	100	-	45	40	15	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
CHACO	CHARATA	-	11	48	41	-	18	59	22	1	-	12	45	43	-	11	68	16	5	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	58	38	4	-	-	42	38	20	-	58	33	9	-	-	43	37	20	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	60	40	-	-	100	-	-	-	-	60	40	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	38	62	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/03/2024 al 27/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	11	89	-	-	87	13	-	-	-	11	89	-	-	84	16	-	A		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	98	2	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	-	-	30	65	5	-	63	30	7	-	-	30	70	-	-	68	29	3	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	7	93	-	-	100	-	-	-	-	9	91	-	-	100	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina